




CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®
CE 0373

PRISTANAK INFORMIRANOG PACIJENTA

NA TRETMAN KEMIJSKE EKSFOLIJACIJE KORIŠTENJEM ENERPEEL® PROIZVODA

INFORMACIJE ZA PACIJENTA

1. UVOD

ENERPEEL® Medicinski Proizvod zadovoljava uvjete Europska Direktive 93/42/CEE, 47/2007/EZ i naknadnim izmjenama/dopunama o medicinskom priboru.

2. DEFINICIJE

ENERPEEL® Medicinski Proizvod se, ovisno o zahtjevima različitih tretmana koji se provode, sastoji od raznih kiselina, u nekim slučajevima i od kiselina različitih koncentracija.

3. SVRHA TRETMANA ENERPEEL® MEDICINSKIM PROIZVODOM

Eksfolijacija ili peeling postupak je kojim se primjenom organskih kiselina postiže kontrolirano oštećivanje kože.

Taj se postupak koristi kako bi se poboljšalo stanje kože. Uklanja se rožnati sloj sa svrhom fiziološke promjene izgleda kože regeneracijom novog epidermisa.

Eksfolijacija se može klasificirati kao vrlo površinska, površinska, srednja ili duboka, a sukladno prirodi eksfolijacijskog agenta koji se koristi kao i vremenu aplikacije na tretiranu površinu prije neutralizacije.

* VAŽNE NAPOMENE

- U skladu s indikacijama, ENERPEEL® Medicinski Proizvod, sukladno kiselini koja se koristi, vremenu nanošenja, slojevima kemijskog eksfolijanta koji se nanosi, karakteristikama pacijenta i patologiji koju tretiramo, može rezultirati kemijskom eksfolijacijom koja je u rangu površinske do srednje – duboke
- ENERPEEL® Medicinski Proizvod se može koristiti samo do datuma uporabe navedenog na pakiranju.

4. INDIKACIJE

Kemijska eksfolijacija, odnosno postupak uklanjanja epidermalnih stanica nakon kojeg slijedi njihova regeneracija, djeluje kao prevencija, kontrola, terapija ili ublažavanje nekih patoloških promjena kože.

Medicinske proizvode ENERPEEL® treba primjenjivati u svrhu zaštite, kontrole, terapije ili ublažavanja različitih kožnih problema kao što su, primjerice, hipertrofijski ožiljci, hiperpigmentirane lezije, kožne elastoze, upalne akne, komedoni, ožiljci od akni te posljedice aktiničkih oštećenja poput keratotičnih lezija koje su potencijalno predkancerogene.

4.1.1. Koža oštećena UV zračenjem

- aktinička keratoza
- solarna elastoza
- solarna lentigoza
- dermatohelioza
- promjene u pigmentaciji

4.1.2. Hiperpigmentirane lezije

- melazma
- postupalna hiperpigmentacija

4.1.3. Akne i ostale indikacije

- površinski ožiljci
- radijacijska keratoza
- acne vulgaris
- ožiljci od akni
- plantarne bradavice
- hiperplazija lojnih žlijezda
- papulamo pustulozna rozacea

5. KRITERIJI ZA IZUZEĆA – KADA NE IZVODITI KEMIJSKU EKSFOLIJACIJU

- herpes simplex u području koje treba tretirati.
- kirurški zahvati obavljeni unutar posljednjih 6 mjeseci (blefaroplastika, lifting očnih kapaka itd.).
- imuno – depresivne bolesti i tretmani u tijeku.
- prethodna radioterapija dijela kože na kojemu će se provoditi kemijska eksfolijacija kako se ne bi ugrozila fiziološka regeneracija kože.
- obiteljska anamneza pojavljivanja keloida i/ili hipertrofičnih ožiljaka.
- obiteljska anamneza razvoja postupalne hiperpigmentacije.
- trudnoća.
- dojenje.
- alergija i/ili poznata preosjetljivost ili bilo koja druga znana i/ili moguća nekompatibilnost s jednom ili više komponenti.
- ostale medicinske okolnosti.

